

## تقييم كفاءة أداة بعض أنواع التبريد

### المستخدمة في حقول الدواجن ودرجة تفضيلها

( دراسة اقتصادية مقارنة )

بين طرقيتي التبريد الصحراوي والتبريد بمبردات الهواء

أ.د. قصي قاسم الكليدار      أ.د. عبد الله الدباش      أ.د. محمد عبد الله حمد  
المعهد التقني / المسيب

### الخلاصة

هناك عدة طرق للتبريد تستخدم في حقول تربية الدواجن منها المركزي والعادي وال الصحراوي . وقمنا بدراسة كفاءة استخدام ودرجة تفضيل بين التبريد العادي و الصحراوي وذلك باستخدام معايير الجدوى الاقتصادية ونظرية Fish bein ( ) وأسلوب النسب المئوية وأستماراة أستبيان وزعت على ٥٠ من أصحاب حقول الدواجن وتوصل البحث إلى أن التبريد الصحراوي مجدى اقتصادياً ويفضله أصحاب الحقول لسهولة استخدامه وقلة كلفته ، ويوصي البحث بتطوير نظام التبريد الصحراوي من خلال الدراسات الفنية وأعتماد تجربته في أنحاء العراق .

### المقدمة

يحتل الإنتاج الحيواني دوراً مهماً في الاقتصاد العراقي ويشكل نسبة 7.35 % من الدخل القومي (١) . وهذه النسبة قليلة مقارنة بما يشكله من نسب في البلدان الأخرى وذلك لأنخفاض كمية الإنتاج وأرتفاع تكاليف تربية الحيوان وأنخفاض أنتاجية الحيوانات سواءً من كميات اللحم المنتج أو الحليب ومشقاته أو البيض ... الخ ، إضافة إلى ذلك أنخفاض أعداد الحيوانات (الاغنام والماعزز والابقار ) بسبب التهريب إلى الدول المجاورة أو بسبب الامراض أو بسبب ذبح الاناث . لذا أصبح من الضروري العناية بتربية الدواجن لأنها تعطي حلولاً سريعة لاحتياجات المجتمع من اللحوم والبيض كبديل للحوم الحمراء .

أن الدواجن ذات تحويل غذائي سريع يبلغ (١:٢) بينما التحويل الغذائي للماشية يبلغ (١:١٨) \* (٢) .

أن تربية الدواجن هي ليست موسمية ولا ترتبط بالظروف الجوية وذلك لأنها وبسبب التطور العلمي والتكنولوجي تمت السيطرة على العوامل الجوية والبيئية وهذه السيطرة تتطلب توفير درجات حرارة مناسبة ونظام غذائي ومسكن ملائم للطيور (٣) . أن درجات الحرارة تؤثر على كفاءة التحويل الغذائي

للدواجن وكذلك الرطوبة وخاصة في فترات الصيف (٤). لأن درجة الحرارة العالية تزيد من حرارة جسم الطير. لذلك يجب خفض الرطوبة والحرارة كي تستطيع الطيور من التنفس وأستهلاك العلف لأجل النمو المستمر وزيادة وزنها (٥). أن عملية خفض الحرارة والرطوبة يتم عن طريق التهوية الصناعية حيث يفضل أن يكون الهواء الداخل إلى قاعات تربية الدواجن طبيعياً وليس على شكل رياح شديدة لأن الرياح الشديدة تمنع الطيور من تناول العلف (٦). وهناك دراسات تناولت احتياجات الدجاج للهواء لأجراء عملية التنفس مقارنة بالمواشي فهي تعادل ثلاثة أضعاف ماتستهلكه المواشي (٧). وفي محطة **Why** ل التربية الدواجن في إنكلترا لوحظ أن الدجاج متوسط الوزن يحتاج إلى (٣)  $4^{\circ}\text{C}$  من الهواء النقي في الساعة الواحدة لذا يجب تبديل الهواء أربع مرات في الساعة (٨). أن الشركة العالمية لأنواع وتربية الدواجن بدأت باستخدام تكنولوجيا متقدمة في تهيئة الظروف البيئية المناسبة ل التربية الدواجن بينما في العراق وبسبب ظروف الحروب الكثيرة التي عاشها العراق وأهتمام النظام السابق بتطوير القدرات العسكرية على حساب القدرات الصناعية والزراعية، ولمواجهة درجات الحرارة العالية في الصيف أتجه مربو الدواجن إلى استخدام أسلوب التبريد الصحراوي<sup>\*</sup> بسبب قلة احتياجاته إلى الطاقة الكهربائية مقارنة بطرق التبريد الأخرى<sup>\*\*</sup> إضافة إلى قلة تكاليف استخدامه وصيانته إضافة إلى ذلك يهتم ظروف قرية من الظروف الطبيعية عند حدوث عطل في منظومة الكهرباء مما يؤدي إلى الأقلال من الهلاكات داخل الحقل وأستمرار الطيور بأستهلاك العلف .

\* أي أن كل (١٨ كغم) علف تعطي (١ كغم) لحم في المواشي بينما كل (٢ كغم) علف تعطي (١ كغم) لحم دواجن . \*\* التبريد الصحراوي هو استخدام الحفاء المرطبة بالماء على شبابيك الحقول من جهة واستخدام مفرغات الهواء من الجهة الثانية

لتنظيم درجات الحرارة والرطوبة في قاعات تربية الدواجن

\*\*\* التبريد الشائع أو العادي هو استخدام المبردات الكهربائية لتبريد حقول الدواجن

مشكلة البحث:-

أن المشكلة التي تواجه تربية الدواجن في العراق هي ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة تكاليف العلف وتكاليف تشغيل وصيانة نظام التبريد العادي (الشائع) ، إضافة إلى أستهلاكها كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية ، أن أي خلل في منظومة الكهرباء سيوقف نظام التبريد مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وأرتفاع نسبة الغازات السامة في الحقول فيؤدي إلى هلاك الدجاج

### أهمية البحث :-

أن الدواجن تمتاز بأنها سريعة النمو وتصل إلى أوزان صالحة للتسويق في مدة تتراوح (٤٥-٥٠) يوماً وبهذا نستطيع توفير جزء من البروتين الحيواني والتعويض عن المنتجات الحيوانية الأخرى كاللحوم الحمراء والحلب وغيرها (٩).

إضافة إلى ذلك فإن تربية الدواجن تعتمد على تكاليف الإنتاج حيث أن قلة التكاليف يؤدي إلى تحقيق أرباح للمربين وهذا يعتمد على كفاءة التحويل الغذائي للطيور ، كما أن تكاليف العلف تشكل نسبة تصل إلى (٦٠%) من تكاليف أنتاج الدواجن (١٠) وأن كفاءة التحويل الغذائي للطيور مرتبطة بتوفير ظروف مناخية ملائمة للطيور ، فكلما كانت الظروف المناخية ملائمة كلما كانت كفاءة التحويل الغذائي عالية ، لذلك فإن استخدام التبريد الصحراوي يوفر الظروف المؤثرة على كفاءة التحويل الغذائي للطيور باتجاه استخدام أقل كمية على لأكبر وزن من اللحم . إضافة إلى خفض تكاليف استخدام الكهرباء والصيانة وقلة الهلاكات .

### فرضية البحث :-

- ١- هل أن التبريد الصحراوي يقلل من تكاليف الأنتاج ويحقق الجدوى الاقتصادية للمربى ام التبريد بمبردات الهواء؟ .
- ٢- هل أن التبريد الصحراوي أكثر تفضيلاً من قبل المربين ام الانواع الأخرى .

### أهداف البحث:-

- ١- يهدف البحث إلى المقارنة بين كفاءة بعض طرق التبريد المستخدمة من قبل مربى الدواجن .
- ٢- يهدف إلى قياس درجة تفضيل مربى الدواجن لطرق التبريد المستخدمة في حقول الدواجن .

### الأسلوب الأحصائي المستخدم:-

- ١- استخدام معايير الجدوى الاقتصادية لمشاريع الإنتاج الزراعي .

$$A_0 = \sum_{i=1}^n a_i b_i j$$

٢- استخدام نموذج Fish bein model

- ٣- أسلوب النسب المئوية:- لتحليل البيانات التي وردت في استمرارات الاستبيان

### الاستعراض المرجعي:

أن تنظيم التهوية يتم على أساس تأمين حاجة الطير إلى هواء نقى ، حيث أثبتت الدراسات أن تبديل هواء قاعات التربية شتاءً هو من (٣ — ٤) مرات في الساعة الواحدة ومن (٦ — ٨) مرات في الساعة الواحدة صيفاً (١١) . وأن تأمين (٣ — ٤) م٢ من الهواء /١ كغم من وزن الطير تسمح بالنمو الطبيعي للطير . وتستخدم طرق عدة لتهوية قاعات التربية الدواجن وتوفير جو ملائم لنمو الأفراخ وتحقيق كفاءة عالية للتحويل الغذائي ومنها:-

١— مبردات الهواء الكهربائية (التبريد الشائع في العراق).

٢— التبريد المركزي .

٣— استخدام مفرغات الهواء في الجهة المقابلة للشبابيك المغطاة بالحلفاء (التبريد الصحراوي).

٤— نصب المداخن في سقوف القاعات لنفريغ الهواء والسماح لدخول الهواء من الشبابيك.

أكدا الباحث م.أ.دياكوف أن احتياج الطير إلى الأوكسجين (O<sub>2</sub>) يصل إلى (١٨,٩) لتر ويطرح (١٨,٦) لتر من غاز (CO<sub>2</sub>) لكل كيلو غرام واحد من الوزن يومياً فمثلاً الدجاجة التي تزن (٢) كغم فأنها تستهلك (٣٧,٨) لتر (O<sub>2</sub>) و تطرح (٣٧,٢) لتر (CO<sub>2</sub>) في اليوم (١٢)

أما نتائج ن.م سبليانسكي فأكدا أن احتياج الأفراخ في الأيام الثلاثة الأولى من عمرها تحتاج إلى (٢) لتر (O<sub>2</sub>) و تطرح (٢) لتر (CO<sub>2</sub>) لكل (١) كغم وزن هي (٧) .

وأن الطير يتحمل درجة حرارة ٣٢° م وبمقدار ٧٥% رطوبة ولكن إذا زادت الحرارة إلى ٣٥° م فيجب خفض الرطوبة إلى ٦٠% وعند زيتها إلى ٣٨° م فيجب أن لا تزيد الرطوبة عن ٣٠% (١٣). أن ارتفاع الحرارة من ٣٢ — ٣٨° م فأن استهلاك الغذاء ينخفض بنسبة ٤,٦% عند كل درجة حرارة أكثر ، كما أن زيادة الحرارة في قاعات تربية الدواجن تؤدي إلى التأثير على كفاءة التحويل الغذائي (١٤).

أن الانتاج التجاري للدواجن في الدول المتقدمة يتجه نحو استخدام ظروف احتجاز صارمة في التربية كاستخدام البيوت المغلقة (خالية من النوافذ) مع ضبط بيئي كلي ، فيجب توفير ظروف بيئية مناسبة جيدة للتهوية وقليلة الرطوبة. أن بحوث التغذية للدواجن أظهرت أن نسبة التحويل الغذائي قبل ٤٠ عاماً كانت ٤:١ وتنتغرق التربية ٨٤ يوماً ، أما في الوقت الحاضر فأن أمكن خفض نسبة التحويل الغذائي إلى ١,٩:١ وتنتغرق التربية ٥٠ يوماً (١٥) . وذلك بتحسين العلائق المستخدمة ولنطيل التكاليف وخاصة تكاليف العلف (١٦). وتقدر كلفة العلف بحوالي ٥٠ — ٦٠% من تكاليف الإنتاج وربما تصل إلى أكثر من ذلك .

## مواد وطرق البحث

تم أجراء البحث في أحد الحقول الاصلية التي يبلغ عددها خمس قاعات ل التربية دجاج اللحم تقع في منطقة الرضوانية محافظة بغداد عام ٢٠٠٥ . تستوعب القاعة الواحدة على عشرة الاف طير للوجبة الواحدة وتم عزل قاعتي من قاعات الحقل حيث خصص أحدهما لتطبيق طريقة التبريد الاعتيادية والآخر لتطبيق طريقة التبريد الصحراوي وبتاريخ ٢٠٠٥/٦/٧ إدخلت وجبتي الأفراخ في القاعتين وبواقع عشرة الاف طير لكل قاعة حيث تم تثبيت العوامل الأخرى من تنظيف وتعقيم ووضع الفرشة والاضاءة والتحصين ضد الامراض وطرق التغذية وطرق شرب الماء حيث كانت جميعها متشابهة في القاعتين . أن طريقة التبريد الاعتيادية تعتمد على وضع مبردات الهواء الكهربائية على شبابيك القاعات والجهة المقابلة لها توضع مفرغات الهواء . أما طريقة التبريد الصحراوي فهي تعتمد على وضع الحلفاء على الشبابيك وأستخدام أنابيب الماء المتقبة لترش الماء على الحلفاء وفي الجهة الثانية توضع مفرغات الهواء التي تقوم بسحب الهواء من القاعات فتحدث خللا في الضغط داخل القاعة فيدخل الهواء من الشبابيك المغطاة بالحلفاء المبللة فيبرد الهواء الداخل إلى القاعة بشكل طبيعي وأنسيابي ولا يشكل تيارات قوية مشابهة لتيارات الهواء التي تحدثها مبردات الهواء الكهربائية . وقد تم تسجيل المعلومات والبيانات عن القاعتين يومياً وكالاتي :-

- ١- كمية العلف المستهلك . كما في الجدول رقم (١،٢)
- ٢- درجة الحرارة اليومية لقاعتين .
- ٣- تسجيل عدد الهلاكات يومياً كما في الجدول (٣،٤)
- ٤- تسجيل أوزان الأفراخ أسبوعياً .
- ٥- حساب معامل التحويل الغذائي للأفراخ كما في الجدول (١،٢)
- معامل التحويل الغذائي = كمية العلف المستهلك (كغم) لفترة معينة  
معدل الزيادة الوزنية للأفراخ (كغم) لنفس الفترة \*
- ٦- حساب التكاليف الثابتة والمتحركة في القاعتين .
- ٧- حساب كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في طريقي التبريد ، حيث أن طريقة التبريد الشائع (العادي) بأسخدام مبردات الهواء الكهربائية تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة أما استخدام طريقة التبريد الصحراوي فأنها تحتاج إلى طاقة كهربائية أقل (مولادات متوسطة الحجم 10Kv ) ، التي تعمل بالديزل .

\* معدل الزيادة الوزنية = الوزن النهائي عند عمر معين - الوزن الابتدائي

الجانب التطبيقي :-

**مكونات طريقة التبريد الشائع (العادي) والصراوي :-**

أ— **مكونات التبريد الشائع (العادي):**— تعتمد هذه المكونات على سعة الحقل والامكانيات المادية لمربى الدواجن فهي تختلف من حقل إلى آخر . وفي بحثنا هذا فإن مكونات التبريد الشائع كانت كالتالي:-

١. ١٢ مبردة هواء سعة (٣٥٠٠) م<sup>٣</sup> أو (٤٥٠٠) م<sup>٣</sup> .

٢. ١٦ مفرغة هواء مختلفة الاحجام (٤ كبيرة و ١٢ متوسطة الحجم) .

٣. أنابيب ماء وأدوات ملحقة لعمليات أいصال الماء إلى مبردات الهواء .

٤. مولدة كهرباء كبيرة ٥٠ Kv لتشغيل قاعات الحقل الخمسة .

ب — **مكونات طريقة التبريد الصراوي:-** تختلف بأختلاف حجم ومساحة الحقل وفي بحثنا هذا فإنها تتكون من :-

١. ١٦ مفرغة هواء متوسطة الحجم .

٢. مضخة ماء لدفع إلى حوض يرتفع إلى أرتفاع أكثر من ٥ م .

٣. حوض ماء حجم ١٠ م<sup>٣</sup> مستند إلى أعمدة وبأرتفاع ٥ م .

٤. أنابيب ماء مع ملحقاتها .

٥. حزم من الحلفاء كي توضع على الشبابيك .

٦. مولدة كهرباء 10 Kv لتشغيل قاعات الحقل الخمسة .

**الإجراءات الإدارية في الحقل :-**

١. تهيئة القاعات حيث نظفت وعمقت وفرشت بنشاره الخشب ، وتم تهيئة نظام التبريد وأصبح جاهزاً للعمل بتاريخ ٢٥/٣/٢٠٠٥ .

٢. تم أدخال الأفراخ إلى القاعتين وبواقع ١٠ إلف فرخ لكل قاعة وبمعدل ٨٠ فرخ /م<sup>٣</sup> وتم تغذيتها في الساعات الاولى بالمحلول السكري بتركيز ٥٪ .

٣. ضبط درجة الحرارة بمعدل ٣٥ م<sup>٠</sup> وبنسبة رطوبة ٦٥ ٧٠ % في كلا القاعتين .

٤. العلف وزع على القاعتين بنفس الكمية والمواصفات .

٥. تُفذ نفس برنامج التحصين ضد الامراض في كلتا القاعتين حيث تم تحصينها ضد مرض النيوكاسل Newcasel ومرض الكوكسيديا ومرض الدم المعدى (IBH) والكمبورو في عمر .

#### قياس كفاءة الاداء لطرق التبريد:-

١. قام الباحثون بسحب عينة عشوائية عدد عشوائي عدد الافراخ فيها ١٠ عشرة من كل قاعة لقياس معدل وزن الافراخ وتحديد نسبة النمو لدى الافراخ وتكرار ذلك أسبوعياً ابتداءً من الأسبوع الأول لدخول الافراخ إلى القاعات جدول رقم (١، ٢) .

٢. تدوين كميات العلف المستهلكه أسبوعياً في كلتا القاعتين جدول رقم (١، ٢) .

٣. تثبتت أعداد الهلاكات من الافراخ في كلتا القاعتين أسبوعياً جدول (٣، ٤) .

٤. قياس كفاءة التحويل الغذائي عن طريق قياس معامل التحويل الغذائي للافراخ

$$\text{معامل التحويل الغذائي} = \frac{\text{كمية العلف المستهلك (كغم)}}{\text{فترة معينة}}$$

معدل الزيادة الوزنية للافراخ (كغم) لنفس

الفترة

وكان النتائج كما هو مؤشر في جدول رقم (٥) .

#### تكليف نصب التبريد الشائع والصحراوي:-

يوضح جدول رقم (٦) أجمالي تكاليف نصب التبريد الشائع باستخدام مبردات الهواء والتبريد الصحراوي . ويمثل جدول رقم (٧، ٨) تكاليف الإنتاج الثابتة والمتغيرة في طريقي التبريد وبالاسعار الجارية .

#### تقييم كفاءة اداء طريقي التبريد الشائع والصحراوي في تبريد حقول الدواجن :-

تم استخدام معايير الجدوى الاقتصادية لمشاريع الإنتاج الزراعي التي تشمل (١٧) :-

$$1. \text{معدل عائد الدينار المستمر} = \frac{\text{أجمالي العوائد (الإيرادات)}}{\text{أجمالي التكاليف}}$$

$$2. \text{نسبة الناتج إلى رأس المال} = \frac{\text{الإيرادات}}{\text{القيمة المضافة}}$$

٣. القيمة المضافة الإجمالية = قيمة الناتج بسعر السوق — قيمة مستلزمات الأنتاج .

٤. القيمة المضافة الصافية = القيمة المضافة الإجمالية — الاندثارات .

٥. صافي الدخل = أجمالي الإيرادات — أجمالي التكاليف .

ويظهر جدول رقم (٩) الإيرادات المتحققة في كلتا القاعتين وجدول (١٠) يمثل نتائج استخدام المعايير الاقتصادية.

### جدول رقم (١)

يمثل معدل الزيادة الوزنية وكميات العلف المستهلك باستخدام التبريد العادي (مبرادات الهواء)

معامل التحويل الغذائي غم علف/غم وزن	العلف المستهلك /كغم	معدل الوزن/غم للطيير الواحد	العمر/أسبوع
٢,٧٤	٩٥٨	٣٥	.١
٢,٣٩	١٧٥٠	٧٣	.٢
٢,٠٣	٤٢٧٢	٢١٠	.٣
٢,٠٢	٧٧٨٠	٣٨٥	.٤
١,٩٧	١٤٥٣٤	٧٣٩	.٥
٢,١٩	٢١١٥٧	٩٦٨	.٦
٢,٤٧	٣٢٥٨٠	١٣٢٠	.٧
٢,٧١	٤٠٠٠	١٤٧٥	.٨
٢,٣٢			متوسط الفترة

جدول رقم (٢)

يتمثل معدل الزيادة الوزنية وكميات العلف المستهلك بـاستخدام التبريد الصحراوي

معامل التمويل الغذائي غم علف/غم وزن	العلف المستهلك /كغم	معدل الزيادة الوزنية / غم للطيير الواحد	العمر/أسبوع
٢,٦٤	٩٢٥	٣٥	.١
١,٩٤	١٧٢٥	٨٩	.٢
١,٧٨	٣٨٩٠	٢١٨	.٣
١,٩٢	٧٩٥٠	٤١٥	.٤
١,٨٦	١٤٥٠٠	٧٨٠	.٥
٢,٢٦	٢٥٥٧٥	١١٣٢	.٦
٢,٢٠	٢٩٥٦٣	١٣٤٥	.٧
١,٩٩	٣٣٨٤٥	١٧٠٥	.٨
٢,٠٧			متوسط الفترة

### جدول رقم (٣)

يتمثل أعداد ونسب الهلاكات طيلة مدة التربية بـاستخدام التبريد العادي (مبردات الهواء)

العمر/أسبوع	عدد الهلاكات	الهلاكات الكلية	عدد الأفراخ الكلي	نسبة الهلاكات = عدد الهلاكات الكلية المجموع الكلي للأفراخ
.١	١٣١	١٣١	٩٨٦٩	% ١,٠٣
.٢	٦٩	٢٠٠	٩٧٣٨	% ٢
.٣	٦٤	٢٦٤	٩٦٦٩	% ٢,٧١
.٤	٨٩	٣٥٣	٩٦٠٥	% ٣,٦٦
.٥	١٠٤	٤٥٧	٩٥١٦	% ٤,٧٩
.٦	١٦٣	٦٢٠	٩٤٤٢	% ٦,٦٠
.٧	٨٤	٧٠٤	٩٢٤٩	% ٧,٥٧
.٨	٧٣	٧٧٧	٩١٦٥	% ٨,٤

### جدول رقم (٤)

يتمثل أعداد ونسب الهلاكات طيلة مدة التربية بـاستخدام التبريد الصحراوي

العمر/أسبوع	عدد الهلاكات	الهلاكات الكلية	عدد الأفراخ الكلي	نسبة الهلاكات = عدد الهلاكات الكلية المجموع الكلي للأفراخ
.١	١٠٨	١٠٨	٩٨٩٢	% ١,٠٩
.٢	٧١	١٧٩	٩٧٨٤	% ١,٨٢
.٣	٤٨	٢٢٧	٩٧١٣	% ٢,٣٢
.٤	٥٩	٢٨٦	٩٦٦٥	% ٢,٩٤
.٥	٧٨	٣٦٤	٩٦٠٦	% ٣,٧٦

%٤,٨٠	٩٥٢٨	٤٦٠	٩٦	.٦
%٥,٨٩	٩٤٣٢	٥٥٩	٩٩	.٧
%٦,٨٥	٩٣٣٣	٦٤٤	٨٥	.٨

### جدول رقم (٥)

يتمثل مقارنة بين كفاءة أنظمة التبريد المستخدمة في الحقل

البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان	البيان
١ عدد الأفراخ في الوجبة	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
٢ كمية العلف المستهلك	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠	٤٤٠٠٠
٣ كمية العلف لكل طير	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠	٤٤,٠٠٠
٤ معامل التحويل الغذائي	٢,٣٢	٢,٣٢	٢,٣٢	٢,٣٢	٢,٣٢	٢,٣٢	٢,٣٢	٢,٣٢	٢,٣٢	٢,٣٢
٥ عدد الهلاكات	٧٧٧	٧٧٧	٧٧٧	٧٧٧	٧٧٧	٧٧٧	٧٧٧	٧٧٧	٧٧٧	٧٧٧
٦ عدد الدجاج المسوّق	٩٢٢٣	٩٢٢٣	٩٢٢٣	٩٢٢٣	٩٢٢٣	٩٢٢٣	٩٢٢٣	٩٢٢٣	٩٢٢٣	٩٢٢٣
٧ وزن الدجاج المسوّق	٣,٨٨٠ طن									
٨ معدل وزن الدجاجة الواحدة	١,٥٠٥ كغم									
٩ كلفة نظام التبريد	٥,٨٤٦,٥٠٠ مليون دينار	٣,٩٨٠,٧٥٠ مليون دينار								
١٠ عدد مرات استخدام نظام التبريد	٣٠ وجبة									

### جدول رقم (٦)

يتمثل مقارنة بين تكاليف أنظمة التبريد المستخدمة في الحقل

البيان	البيان	البيان	البيان
تكلفة شراء الأفراخ	١٢٥ دينار / للواحد	١٢٥ دينار / للواحد	١٢٥ دينار / للواحد
تكلفة نقل الأفراخ	٧٥ ألف دينار	٧٥ ألف دينار	٧٥ ألف دينار
تكلفة الأعلاف	١٨٥ ألف / للطن	١٨٥ ألف / للطن	١٨٥ ألف / للطن
تكلفة الأدوية و الأشراف البيطري	٢٥٠ ألف دينار	٢٥٠ ألف دينار	٢٥٠ ألف دينار
تكلفة الماء و الكهرباء	١٥٠ ألف دينار	١٠٠ ألف دينار	١٠٠ ألف دينار
تكلفة العمالة	١٨٠ ألف دينار	١٨٠ ألف دينار	١٨٠ ألف دينار
الفائدة على رأس المال المستثمر %١٢	٩٦٠ ألف دينار	٩٦٠ ألف دينار	٩٦٠ ألف دينار
أندثار الحقل (تكلفة أيجار الحقل )	١٥٠ ألف دينار	١٠٠ ألف دينار	١٠٠ ألف دينار

### جدول رقم (٧)

يتمثل تكاليف الانتاج الثابتة و المتغيرة في التبريد الصحاوي

مفردات تكاليف الإنتاج الثابتة	المبلغ /دينار	مفردات تكاليف الانتاج المتغيرة	المبلغ دينار
الفائدة على رأس المال	٩٦٠٠٠	قيمة شراء الأفراخ	١,٢٥٠,٠٠٠
الأندثارات (أيجار المحل)	١٥٠٠٠	العمالة	١٨٠٠٠
أندثار منظومة التبريد	٩١,٦١٣	قيمة العلف المستهلك	٦,٨٤٥,٠٠٠
		تكلفة النقل	٧٥٠٠٠
		الأدوية والأشراف البيطري	٢٥٠٠٠

١٠٠٠٠٠	كلفة الماء والكهرباء			٦
١٠٠٠٠٠	الصيانة			٧
٨,٨٠٠,٠٠٠		١,١٩١,٦١٣	المجموع	

الأجمالي / ٩٩١,٦١٣ دينار

جدول رقم (٨)

يتمثل تكاليف الأنتاج الثابتة والمتغيرة في التبريد العادي

المبلغ دينار	مفردات تكاليف الأنتاج المتغيرة	المبلغ / دينار	مفردات تكاليف الأنتاج الثابتة	ت
١,٢٥٠,٠٠٠	قيمة شراء الأفراخ	٩٦٠٠٠	الفائدة على رأس المال	١
١٨٠٠٠	العمالة	١٥٠٠٠	الأندثارات (أيجار الحفل)	٢
٧,٤٠٠,٠٠٠	قيمة العلف المستهلك	١٨٨,٢١٧	أندثار منظومة التبريد	٣
٧٥٠٠	كلفة النقل			٤
٢٥٠٠٠	الأدوية والأشراف البيطري			٥
١٥٠٠٠	كلفة الماء والكهرباء			٦
١٠٠٠٠٠	الصيانة			٧
٩,٤٠٥,٠٠٠		١,٢٨٨,٢١٧	المجموع	

الأجمالي / ١٠,٦٩٣,٢١٦

جدول رقم (٩)

الإيرادات

أجمالي الإيرادات = المبيعات × سعرها

التبrier العادي	التبrier الصحراوي
$12,353,200 = 890 \times 13,880$	$16,233 \text{ دينار} = 890 \times 14,447,370 \text{ دينار}$

جدول رقم (١٠)

نتائج حساب بعض المعايير الاقتصادية المستخدمة في التقويم

المعيار	التبrier الصحراوي	التبrier العادي
معدل العائد	١,٣٩٦	١,١٧٢
القيمة المضافة الإجمالية / دينار	٤,٨٨٩,٤١٠	٢,٩٤٨,٢٠٠
القيمة المضافة الصافية / دينار	٤,٥٤٧,٧٩٧	٢,٦٠٩,٩٨٣
نسبة الناتج إلى رأس المال	٠,٠٥٠	٠,٠١٣
صافي الدخل / دينار	٣,٦٩٧,٧٩٧	١,٦٦٩,٩٨٤

قياس درجة تفضيل أصحاب الحقول لطريق التبريد الشائع والصحراوي :

لأجل معرفة درجة تفضيل أصحاب الحقول (مربي الدواجن) لأي نوع من أنواع التبريد تم استخدام نموذج (١٨) .

**Fishbein model**

$$A_0 = \sum_{i=1}^n a_i b_i j_i$$

دورية فصلية علمية محكمة تصدر عن كلية الإدارة والاقتصاد

حيث أن

$A_0$  = موقف مربي الدواجن أتجاه نوع التبريد

$=ai$  = التقييم السلبي أو الأيجابي للخاصية (i)

$bij$  = قوة الأعتقد بأن التبريد يمتلك الخاصية (i) أو لا يمتلك .

$n$  = عدد الخصائص في نظام التبريد

وتم ترتيب البديل حسب قيمة الموقف حيث أن البديل الذي يحصل على أعلى قيمة يمثل المرتبة الأولى وهكذا لبقية البديل . أن النموذج Fishbein يتطلب تصميم استقرار استبيان وفق مكونات النموذج و كالتالي :

- ١- طلب من أصحاب الحقول تقييم الخصائص التي تم تحديدها بالنسبة لـة كمنتج وهذا السؤال يمثل (ai) في النموذج .
- ٢- طلب من أصحاب الحقول أن يحددو ما يعتقدونه في مدى توفر أو عدم توفر الخصائص في نظام التبريد الصحراوي والتبريد العادي .

#### الخصائص التي تم تحديدها لطريقتي التبريد

١- كفاءة الأداء .

٢- كلفة الشراء والنصب والصيانة .

٣- سهولة الأستخدام .

٤- العطلات والتوقفات .

٥- عمر الأستخدام .

لقد شمل الاستبيان (٥٠) من أصحاب الحقول ومربي الدواجن في المناطق التي تستخدم طرق مختلفة للتبريد .

وبتطبيق Fishbein model نحصل على :

التبريد الصحراوي =  $281,28$  التبريد الشائع (العادي) =  $136,92$  وهذا يظهر تفوق التبريد الصحراوي على التبريد الشائع بدرجة أفضليّة لدى مربي الدواجن و استخدامة على مدى واسع في حقول الدواجن .

### تحليل الأنجابات التي وردت في استمارات الأستبيان :

شملت عينة البحث ٥٠ شخصاً من مرببي الدواجن وأصحاب حقول تربية الدواجن في المناطق المحيطة ببغداد بأعتبارها أكثر المناطق المستخدمة للتبريد الصحراوي ، حيث تمت مقابلتهم وملاسستهار الأستبيان على ضوء أجاباتهم ، وبعد تصنيف و تبوييب وتحليل البيانات والمعلومات ظهر ما يلي :

- ١- ظهر من عينة البحث أن ٨٠% من الذين شملتهم الدراسة يستخدمون التبريد الصحراوي حيث تبين أن مدة الاستخدام تتراوح ما بين ١٠-٥ سنوات حيث تبين أن هذه الطريقة بدأت تنتشر عام ١٩٩٥ .
- ٢- أجاب ٩٧% من الذين يستخدمون التبريد الصحراوي أن هذا النظام سهل الاستخدام ولا يحتاج إلى فنيين للأشراف عليه كما هو حال التبريد باستخدام مبردات الهواء فهي طريقة سهلة للاستخدام تتمثل بأنسياب الماء في أنابيب ثم يرش الماء على الحلفاء وتقوم مفرغات الهواء بسحب الهواء من داخل القاعات فيحدث تخلخل في الضغط مما يؤدي إلى دخول الهواء إلى داخل القاعة مروراً بالحلفاء المبللة فيبرد الهواء .
- ٣- أجاب ٩٩% من الذين شملتهم الدراسة بأن التبريد الصحراوي طريقة سهلة الاستخدام وذات كلفه قليله و عمرها الاستخدامي طويل ولا يحتاج إلى صيانة مستمرة حيث يبدل فيها الحلفاء كل عامين وعملية استبداله لا تحتاج خبره فنيه .
- ٤- ذكر ٧١% من الذين شملتهم الدراسة والذين يستخدمون التبريد الصحراوي بأن الأفراح تستهلك علف أقل مما هو عليه في التبريد العادي وأن أوزانها أكثر من تلك التي تربى في ظروف التبريد العادي .
- ٥- ذكر ٩٨% من الذين شملتهم الدراسة بأنهم استخدمو التبريد الصحراوي في العام الواحد لثلاث وجبات تربية اعتباراً من شهر أذار وحتى شهر تشرين الأول وأثبتت جداره في تهيئه جو مناسب لتربية الأفراح .
- ٦- ذكر ١٠٠% من الذين شملتهم الدراسة بأن استخدام التبريد الصحراوي يحتاج إلى بناء (قاعات تربية) مبنيه من مواد عازله للحراره وسقوف عازله كي تحافظ على الحراره في القاعات .
- ٧- ذكر ٧٤% من الذين شملتهم الدراسة أن المشاكل التي تواجه التبريد الصحراوي هو عدم دقنه أو ضبط اطار الشبابيك مما قد يؤدي إلى دخول الماء إلى القاعه وترطيبها وأصابه الدواجن بالأمراض .
- ٨- تبين من أجابات الذين شملتهم الدراسة بأنه يمكن استخدام التبريد الصحراوي لمخالف مساحات القاعات حيث ظهر أن هناك قاعات أطوالها ١٠٠ م عرضها ١٢ متر وأخرى أطوالها ٥٠ م وعرضها ٨ م وبصورة عامه يمكن استخدامه لجميع المساحات .
- ٩- ذكر حوالي ٩١% من الذين شملتهم الدراسة بأن نسبة الهلاكات قليله ب باستخدام التبريد الصحراوي ، وأن معظم الهلاكات التي تحدث هو ليس بسبب الحراره فقد تكون أسبابها الأمراض أو تكس الأفراح .

١٠- أن الهواء في التبريد الصحراوي لا يكون تيارات هوائية عاليه وسرريعه تخفض درجة الحرارة بسرعه مما قد تسبب أصابه الأفراخ بالأمراض كما هو الحال في التبريد العادي وهذا ما ذكره ٩٢٪ من الذين شملتهم دراسه .

### الاستنتاجات و التوصيات

#### الاستنتاجات :

يستخدم التبريد الصحراوي بدلاً من التبريد بمبردات الهواء وذلك

أ- أقل كلفه وقلة العطلات والتوقفات التي تحدث فيه .

ب- يؤثر تأثيراً في زياده وزن الدجاج من خلال معامل التحويل الغذائي.

ج- لا يحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة فيمكن أن يعمل بمولده كهرباء لا تتجاوز قدرتها على  $5\text{ Kv}$  لفاعة تربية طولها  $100\text{ cm}$  وعرضها  $10\text{ cm}$  .

٢- يمكن استخدام التبريد الصحراوي لمختلف مساحات قاعات التربية دون استثناء ولمختلف مناطق العراق .

٣- هناك فترات لا يمكن استخدام التبريد بمبردات الهواء بسبب برودة الجو والتي تسبب الأمراض للدواجن مما يستدعي استخدام التبريد الصحراوي .

٤- أن استخدام التبريد الصحراوي مجيء اقتصادياً مقارنه بالبريد بمبردات الهواء وذلك بسبب قلة الهلاكات وقلة كلفة الإنتاج وأرتفاع أوزان الأفراخ بسبب التمويل الغذائي الجيد وهذا ينعكس على الأيراد الصافي المتحقق .

٥- أن التبريد الصحراوي لا يزال محصوراً على بعض مناطق العراق وذلك بسبب عدم معرفته في المناطق الأخرى وعدم تجربته .

#### الوصيات :

١- أن تقوم وزارة الزراعة بحملات دعائية وأعلامية لاستخدام التبريد الصحراوي مبينة أهمية قلة كلفته وسهولة استخدامه والنتائج التي تم الحصول عليها من استخدامه .

٢- التعاون مع أصحاب الحقول الذين يقومون باستخدام التبريد الصحراوي لجعلها مشاهدات لآخرين ويتم ذلك عن طريق مديرية الأرشاد الزراعي ودعوة أصحاب الحقول التي تستخدم التبريد الصحراوي .

٣- إجراء دراسات الجوى الاقتصادية للتبريد الصحراوي في مناطق العراق المختلفة .

٤- أن تقوم وزارة الزراعة بأعداد الدراسات عن القاعات التي يمكن استخدام التبريد الصحراوي فيها من حيث المواد المستخدمة ومساحاتها والشبيك ..... الخ .

٥- تطوير أنظمة التبريد الصحراوي الحالية من خلال دعوة الفنيين العراقيين إلى دراسه هذا النظام وتطويره لجعله أكثر فاعلية من خلال تصنيع أنظمة أكثر تطوراً مما هو مستخدم الان .

### المصادر

- ١- المنظمة العربية للتنمية الزراعية - التقرير السنوي للتنمية الزراعية العربية لعام ٢٠٠٠
- ٢- خليفه ، خالد زيدان وآخرون "تنمية الدواجن في العراق" دراسه رقم (٦-٧) المجلس الزراعي الاعلى - مطبعة الرشاد. بغداد ١٩٧٨ .
- ٣- سميتيف ، س ((أنتاج الدواجن )) ترجمة مصلح حسين بنيان .جامعة البصرة ١٩٨٣ .
- ٤- محمد ، عبد الله حميد ((تغذية فروج اللحم في المناطق الحاره) مجلة الزراعة العراقية ،المجلد ٢ العدد ١ ١٩٩٧ ، .
- ٥- يوتايس، هاري وجيمس فرتر ((التغذية العلمية للدواجن )) ترجمه على عبد الكريم العطار -جامعة البصره ١٩٨٠ .
- ٦- الجبوري ، محمد عبد الجبار ((تربية الدواجن في الحدائق المنزليه )) دار التضامن بغداد ١٩٦٤ .
- ٧- ناجي ،سعد عبد الحسين ،عزيز سمير حنا ((دليل تربية فروج اللحم )) الأتحاد العربي للصناعات الغذائية ١٩٩٩ .
- ٨- الجبوري ، محمد عبد الجبار - مصدر سابق .
- ٩- رافت ، محمد علي ((أصول تغذية الحيوانات ودواجن المزرعة )) مكتبة الأنكلو مصرية - ١٩٧٢ القاهرة .
- ١٠- المنظمة العربية للتنمية الزراعية - التقرير السنوي ، للتنمية الزراعية العربية لعام ١٩٩٨ .
- ١١- الزجاجي ، رضا ((دروس علمية في الدواجن )) كلية الزراعة جامعة السليمانية ١٩٧٨ .
- ١٢- سميتيف ، س ((أنتاج الدواجن )) مصدر سابق .
- ١٣- سميتيف ،س ((أنتاج الدواجن )) مصدر سابق .
- ١٤- محمد، عبد الله حميد ((تغذية فروج اللحم في المناطق الحارة )) مصدر سابق
- ١٥- يوتايس، هاري وجيمس فرتر ((التغذية العلمية للدواجن )) . ترجمة على عبدالكريم العطار -جامعة البصرة - ١٩٨٠
- ١٦- بارتا ، بيركنسر وآخرون ((الأعلاف غير التقليدية في علائق الحيوانات الزراعية)) ترجمة محمد رياض عباس - جامعة بغداد ١٩٨٨
- ١٧- الدهري ، عبد الوهاب مطر ((تقييم المشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية )) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغداد / ١٩٩٠ .

١٨ - الصميدعي ، محمود جاسم وردinne عثمان يوسف ((الأساليب الكمية في التسويق )) دار المناهج ، عمان -الأردن - ٢٠٠١ .

بسم الله الرحمن الرحيم

## استمارة استبيان البحث المرسوم .

قياس كفاءة استخدام بعض طرق التبريد المستخدمة في حقول الدواجن يرجى الإجابة عن الأسئلة بدقة ووضوح خدمة للصالح العام شاكرين تعاونكم معنا .

٢- أيهم أسد هل اس تخداماً ؟ التبرير دالا صهراوي التبرير د ردات اله واء بعد

٣- اذا كنت تستخدم التبديل الصحيح، فهل بدأ باستخدامه

٤- لماذا يمتاز التبريد الصحراوي عن التبريد بمبردات الهواء؟ يرجى ذكر ذلك؟

٥- أيهم صهراوي دالـة التـبرـيـةـ كـافـةـ اـعـالـىـ اـمـ التـبـرـيـ بـمـبـرـدـاتـ الـهـ وـاءـ وـلـمـ سـاـذـاـ

٦- أيهم أط ول عم رأ للأس تعمال؟ التبريد د الصحراوي  
أم التبريد بمبردات الهواء  
ولم . ولهذا

٧- أي من النظراء أكثـر كفـاءة؟ التـبريد الـصـحـراـوي  
أم التـبريد بـمـبرـدـات الـهـواء  
ولـمـاـذا

٨- أيهما أكثر عرضة للعطلات والتوقفات؟ التبريد الصحراوي أم التبريد بمبردات الهواء

٩- أي من النظامين يعرض الطيور لامراض أكثر؟ التبريد الصحراوي أم التبريد  
بردات بماء الهراء

- ١٠ - أي من النظامين يسبب نسبة هلاكات أكثر ؟ التبريد الصحراوي  
أم التبريد بمبردات الهواء .
- ١١ - أيهما أكثر فعالية في زيادة نمو الأفراخ ؟ التبريد الصحراوي  
أم التبريد بمبردات الهواء .
- ١٢ - أيهما أكثر فعالية على أستهلاك العلف ؟ التبريد الصحراوي  
أم التبريد بمبردات الهواء .
- ١٣ - أي مساحة لقاعات التربية يمكن استخدام التبريد الصحراوي فيها كبيرة  
طة . متواضعة . صغيرة .
- ١٤ - هل تتصح الآخرين باستخدام التبريد الصحراوي ؟ نعم  
كلا .
- ١٥ - ما هي المشاكل التي تعرّض استخدام التبريد الصحراوي  
يرجى ذكرها .

مع الشكر والتقدير

الباحثون

جدول رقم (١١)

تقييم الخصائص الموجودة في أنظمة التبريد من قبل أصحاب الحقول (ai)

الملاحظات	المجموع	غير مهم	قليل الأهمية	وسط	مهمة	مهمة جداً	التقييم الخصائص
	٥٠	٥	٧	٨	١٠	٢٠	١. كفاءة الاداء
	٥٠	٩	١٠	٧	٩	١٥	٢. كلفة الشراء
	٥٠	٥	٦	٩	١٣	١٧	٣. سهولة الاستخدام
	٥٠	١٠	٨	١٢	٩	١١	٤. العطلات و التوقفات
	٥٠	٢	٦	١١	١٢	١٩	٥. عمر الاستعمال

جدول رقم (١٢) القيم الترجيحية بالوزان المقابلة

المتوسط	المجموع	غير مهم	قليل الأهمية	وسط	مهمة	مهمة جداً	التقييم الخصائص
٠,٦٦	٣٣	١٠ -	٧ -	صفر	١٠	٤٠	١. كفاءة الاداء
٠,٢٢	١١	١٨ -	١٠ -	صفر	٩	٣٠	٢. كلفة الشراء
٠,٦٢	٣١	١٠ -	٦ -	صفر	١٣	٣٤	٣. سهولة الاستخدام
٠,٠٦	٣	٢٠ -	٨ -	صفر	٩	٢٢	٤. العطلات و التوقفات
٠,٨	٤٠	٤ -	٦ -	صفر	١٢	٣٨	٥. عمر الاستعمال

### جدول رقم (١٣)

قوة الاعتقاد بأن التبريد الصحراوي يوفر الخصائص bij

المجموع	لايوفر ٢ -	قليل ١ -	وسط	متوسط كثيراً ١+	كثيراً جداً ٢+	التقييم	
						الخصائص	الخصائص
٥٠	صفر	١	٥	١٧	٢٧	١. كفاءة الاداء	
٥٠	صفر	صفر	صفر	١٠	٤٠	٢. كلفة الشراء	
٥٠	صفر	صفر	صفر	١٣	٣٦	٣. سهولة الاستخدام	
٥٠	١٩	١٧	٦	٥	٣	٤. العطلات والتوقفات	
٥٠	صفر	١	٥	١٧	٢٧	٥. عمر الاستعمال	

### جدول رقم (١٤)

القيم الترجيحية بالوزان المقابلة

المتوسط	المجموع	غير متوفّر	فليل	وسط	متوفّر	متوفّر جداً	التقييم	
							الخصائص	الخصائص
٠,٨	٤٠	صفر	١ -	صفر	١٧	٢٤	١. كفاءة الاداء	
١	٥٠	صفر	صفر	صفر	١٠	٤٠	٢. كلفة الشراء	
٠,٨٩	٤٥	صفر	صفر	صفر	١٣	٣٢	٣. سهولة الاستخدام	
٠,٢٨	١٤ -	٣٨ -	١٧ -	صفر	٢٥	١٦	٤. العطلات والتوقفات	
١	٥٠	صفر	صفر	صفر	٢٧	٢٣	٥. عمر الاستعمال	

جدول رقم (١٥)

مدى توفر الخصائص في التبريد الشائع (العادي) bij

المجموع	غير متوفرة جداً	غير متوفرة	وسط	متوفّر	متوفّر جداً	التقييم الخصائص
	٢ -	١ -		١ +	٢ +	
٥٠	١	٥	١٩	١٤	١١	١. كفاءة الاداء
٥٠	صفر	صفر	٧	٢٠	٢٣	٢. كلفة الشراء
٥٠	صفر	١	٨	٢٤	١٧	٣. سهولة الاستخدام
٥٠	صفر	١	٢	١٠	٣٦	٤. العطلات والتوقفات
٥٠	صفر	١	٤	٢٨	١٧	٥. عمر الاستعمال

جدول رقم (١٦)

ترجيح الارقام إلى الاوزان المقابلة لها

المجموع	غير متوفّر جداً	غير متوفّر	وسط	متوفّر	متوفّر جداً	التقييم الخصائص
	٢ -	٥ -	صفر	١٤	٢٢	
٢٩	٢ -	٥ -	صفر	١٤	٢٢	١. كفاءة الاداء
٤٦	صفر	صفر	صفر	٢٠	٢٦	٢. كلفة الشراء
٤٧	صفر	١ -	صفر	١٤	٣٤	٣. سهولة الاستخدام
٤١	صفر	١ -	صفر	١٠	٣٢	٤. العطلات والتوقفات
٤١	صفر	١ -	صفر	٨	٣٤	٥. عمر الاستعمال